Divers Coléoptères nouveaux de la République Argentine[1]

PAR

M. Pic

Ptinus rubricollis n. sp. Satis elongatis, nitidus, supra sat breve hirsutus, niger, elytris minute rufo aut albo notatis, antennis ad basim, pedibus, capite thoraceque rubris.

Assez allongé, brillant, orné en dessus de quelques poils peu longs, mi-dressés, tête, écusson et poitrine plus ou moins densément pubescents de blanc, noir avec les élytres ornés de petits dessins roux ou blancs, base des antennes, pattes, tête et prothorax rouges. Tête avec les yeux peux plus larges que le prothorax en avant; antennes grêles, courtes, rembrunies avec la base plus claire; prothorax granuleux, assez court et peu large, fortement étranglé postérieurement, sillonné transversalement; élytres bien plus larges que le prothorax, longs, faiblement élargis avant l'extremité, et atténués postérieurement, à rangées rapprochées de points transversaux séparées par un coté étroite, ornés de deux rangées obliques de macules, en partie subfasciées, soit rousses, soit blanches, avec une petite macule blanche antéapicale; pattes roussâtres, grêles, cuisses un peu claviformes et en partie rembrunies. Long. 4 mill. Cerro Negro. Chubut, 15-II-1927 (Juan Fortuna leg.).

Jolie espèce, particulière par sa coloration et pouvant prendre place près de *P. posticatus* Pic.

Calymmaderus argentinus n. sp. Sat elongatus, rufobrunnescens, capite pallidiore, sat dense griseo pubescens, elytris medio pro parte fulvo brunnescentibus.

Assez allongé, atténué aux deux extrêmités, revêtu d'une pubescence grise, rude, assez dense avec sur le milieu des élytres, des macules

---

(1) C'est encore à Mr. C. Bruch, que je dois la connaissance des nouveautés faisant l'objet de ce nouvel article. Les types uniques se trouvent dans la collection Bruch et je possède seulement *Nemognatha Weiseri* et sa variété.

d'un fauve brunâtre, tête plus claire; yeux grands et noirs; prothorax assez court, très rétréci sur son milieu antérieur, presque etroit sur les côtés, finement et densément ponctué, pubescent, à ligne médiane glabre; écusson petit; élytres à peine plus larges que le prothorax à épaules marquées, subparallèles, puis obliquement rétrécis postérieurement, finement et densément ponctués, à plusieurs stries latérales inégales et nettes. Long. 4 mill. Province Santiago del Estero (C. Bruch).

Voisin de *C. subnotatus* Pic, s'en distingue par la pubescence plus rude et différente, l'aspect moins brillant, la forme du corps plus élargie, le prothorax plus nettement rétréci antérieurement.

Emplectus Bruchi n. sp. ♂. Elongatus, opacus, nigro-piceus, thorace antice et lateraliter, elytris ad humeros breve et ad medium late coxisque testaceis.

Allongé, opaque, noir de poix avec le pourtour du prothorax, moins la base, partie des élytres, hanches et parfois base des cuisses testacés. Tête moyenne, yeux grands et saillants; antennes, à partir du 3ème. article, portant un long rameau placé à la base des tiges; prothorax peu large, arqué en avant, presque droit sur les côtés avec les angles postérieurs un peu saillants, à sillon postérieur médian et carène antérieur; élytres de la largeur du prothorax, longs, subparallèles, ornés chacun de 3 côtes principales, à pontuation médiocre et plis transversaux en partie irréguliers, noir de poix, ornés d'une macule humérale et d'une fascie médiane testacées; pattes brunâtres. — Long: 7 mill. Gob. Misiones. (C. Bruch).

Tres voisin de *E. laticollis* Pic, en diffère par les élytres plus allongés, ayant les côtes moins saillantes, la pontuation moins profonde et transversal, le prothorax à bord antérieur médian non régulirement arqué et teinté de clair.

Anthicus (Ischyropalpus) sericans v. nov. **trireductus.** Subparallelus, fere opacus, sericeo pubescens rufo-testaceus, elytris in singulo nigro trimaculatis, sutura testacea; thorace robusto, antice valde dilatato, opaco. — Gob. Chaco. (C. Bruch).

Diffère au moins de la forme type par la coloration largement claire des élytres, ces organes ayant chacun trois macules discales foncées isolées.

Anthicus (Ischyropalpus) catamarcanus v. nov. **esteroensis.** Elongatus, nitidus, parum et sparse pubescens, rufescens, abdomine elytrisque piceis, his post basim testaceo fasciatis; thorace sat robusto, antice rotundato-dilatato. — Girardet, Santiago del Estero.

Diffère de la forme type par la coloration générale moins foncée et les élytres offrant une fascie antérieure testacée.

Nemognatha Weiseri n. sp. Oblongo-elongata, nitida, parum pubescens, rufo-testacea, membris pro parte, oculis et infra corpore pro parte nigris, scutello plus minusve piceo aut rufescente; elytris rufo-testaceis, in disco nigro arcuate-vittatis (forma typica), aut rufo-testaceis (v. nov. **invittata**).

Oblong allongé, brillant, orné de quelques poils courts en dessus, à ponctuation forte, plus rapprochée sur les élytres que sur l'avant-corps, roux-testacé avec partie des membres et du dessous noirs; tête d'une roux testacée, parfois maculée de foncé en dessous derrière les yeux, sommet des mandibules et des palpes foncé, un peu gibbeuse en avant du cou qui est très distinct, tempes saillantes; antennes noires à 1er. article roux, peu épaisses; prothorace court et large, un peu élargi en avant; écusson variable, plus ou moins obscurci ou roussâtre; élytres assez larges et courtes, un peu convexes, soit testacées avec une bande discale noire raccourcie un peu arquée et le dessous des épaules rembruni (forme type), soit concolores (var. *invittata*); pattes robustes, testacées avec les tarses et parfois le sommet des tibias noirs; dessous du corps d'un roux testacé diversement marqué de foncé.—Long: 8-10 mill. La Cienega (Dep. Belén), Catamarca, III, 1920 (Weiser).

Diffère de *N. nigronotata* Pic, entre autres caractères, par l'avant corps plus robuste, le prothorax immaculé, les genoux non marqués de noir.

Stenispa sulcatifrons n. sp. Elongata, alutacea, sat nitida, nigra, supra aeneo tincta, elytris olivaceis.

Allongé sans être étroit, dessus alutacé et en plus fortement ponctué, assez brillant, noir, avec des refflets bronzés sur l'avant-corps et olivâtres sur les élytres. Tête faiblement sillonnée sur le vertex, alutacée et ornée dex quelques petits points espacés; antennes un peu robustes, plus étroites à la base, à dernier article assez acuminé; prothorax assez court et large, presque droit sur le côtés, rétréci en avant avec les angles antérieurs un peu avancés, alutacé, irrégulièrement et éparsément ponctué, les points étant petits ou gros; élytres un peu plus larges que le prothorax, assez longs, subsinués latéralement, rétrécis à l'extrêmité, alutacés et à rangées de points moyens, effacés posterieurement avec quelques traces de stries; pattes robustes. — Long: 5 mill. Corrientes, San Roque, II, 1920 (Bosq).

Voisin de *S. metallica* F., en diffère par la forme moins allongée, le prothorax plus large et en partie fortement ponctué, la tête sillonnée sur le vertex. Diffère, d'autre part, de *S. robusticollis* Pic, par la forme moins élancée, le prothorax plus court, la ponctuation différente, en partie plus grosse et la coloration non uniforme du dessus du corps.

? Charistena elongaticeps n. sp. Elongata, nitida, testacea, capite in vertice, thorace medio, scutello, elytris ad suturam, pectoreque pro parte viridimetallicis.

Allongé, brillant, testacé avec le milieu de la ête sur le vertex, celui du prothorax, l'écusson, le 1er. intervalle vers la suture et une partie de la pointrine teintés de vert métallique. Tête longue et étroite, courtement bicarénée et impressionnée entre les yeux, qui sont grands et non saillants, en partie alutacée, sans ponctuation appréciable; antennes (cassées) à 2 premiers articles en partie roux; prothorax testacé, à large bande médiane verdâtre, presque carré, faiblement, subsinué sur les côtés à angles antérieurs droits, munie d'un pore pilifère, marqué sur son milieu de très grands points et sur les côtés de points moins distincts; élytres bien plus larges que le prothorax, pas

très longs, subparalleles, subarrondis au sommet, denticulés sur les côtés et à l'extrémité, tricostés avec les intervalles à 2 rangées de gros points en partie confluents; dessous du côrps et pattes testacées, poitrine en partie verdâtre; pattes assez longues, pas très robustes, tibias intermédiaires non crochu. — Long.: 5 mill. Province Salta, 15-II-1905. (C. Bruch).

Les antennes manquant, je ne suis pas absolument certain de l'identification générique de cette espèce évidemment au groupe des *Chalepini;* elle diffère par la forme plus étroite du corps de tous les *Anoplistes* Chap. que je possède et se rapproche, d'autre part, par sa forme de *Charistena brevelineata* Pic et voisins dont il diffère, à première vue, par la coloration, la tête plus allongée, le prothorax plus droit sur les côtés.